

c) Zomerbewerkingen

Van de opschietende ranken de twee bovenste laten gaan (enkel de hechtranken verwijderen en intoppen in juli. De andere scheuten op 2-3 bladeren innipen. Ook op de stam zelf nijpen we de uitlopende scheuten in op 2 bladeren zodanig dat het stammetje nog kan dikken.

d) Het derde jaar

Opgelet, nu snoeien we eind februari, begin maart teneinde bloeden (uitlopen van plantensappen) te beperken. Van de twee lange opgaande ranken leggen we de hoogste plat. Dit enkel bij warm weer (de scheuten zijn dan iets soepeler). De laagste van de twee wordt ingesnoeid op 2 ogen en vervangen volgend jaar de huidige scheut. De afgebogen scheut snoeien we in op 5 à 10 ogen afhankelijk van de dikte van de scheut.

e) Vervangingssnoei

Elk jaar opnieuw wordt de laagste ingesnoeid en de hoogste platgebogen.

f) Tips

Opgelet, nu snoeien we eind februari, begin maart teneinde bloeden (uitlopen van plantensappen) te beperken. Van de twee lange opgaande ranken leggen we de hoogste plat. Dit enkel bij warm weer (de scheuten zijn dan iets soepeler). De laagste van de twee wordt ingesnoeid op 2 ogen en vervangen volgend jaar de huidige scheut. De afgebogen scheut snoeien we in op 5 à 10 ogen afhankelijk van de dikte van de scheut.

g) Stekken

Stekken is het vermeerderen door het nemen van een éénhoogstek. Het nemen van stekken kan best in de maanden december tot februari wanneer de druivelaars in rust zijn. Dit kan gebeuren door het nemen van winterstekken of een éénhoogstek. Dat laatste is het eenvoudigste.

We vertrekken van een potlooddikke éénjarige scheut in ontdooide toestand. De ogen moeten voldoende ontwikkeld zijn en vrij van ziekten.


7 Buitenteelt voor liefhebbers

a) Het eerste jaar

Planten in het voorjaar op 1,6 meter afstand in de rij, tussen de rijen 1,8 tot 2 meter. De onderste draad is best al bij de planting aanwezig, alsook de palen. De onderste draad zetten we op 70 cm van de grond, de tweede op 90 cm. Hierboven komen nog 3 draden (zie afbeelding).

Aan de jonge druivelaar zetten we steeds een steunstok. In het eerste jaar (april) snoeien we de druivelaar in op één oog (steeds 1 cm boven het oog snoeien teneinde indrogen van het oog te voorkomen). Dit oog zal uitlopen, maar ook enkele "slapende" zullen dit doen.

Als ze 20 - 25 cm hoog zijn verwijderen we ze allen met uitzondering van de beste scheut. Deze scheut binden we aan en toppen hem in als hij boven de tweede draad uitkomt, de okselscheuten (dieven) nippen we in op één blad.



Opleidingssnoei in de wijngaard (schetsmatig)

b) Het Tweede jaar

Ook in het tweede jaar snoeien we in april. Dit houdt in dat we de vorig jaar gevormde rank insnoeit tot op een 60 cm boven de grond (onder de tweede draad).

Insnoeien enkel als de tak de dikte heeft van een potlood, anders moet de procedure van het eerste jaar opnieuw toegepast worden. Hierna steeds de dieven verwijderen en de scheut aanbinden.

c) Zomerbewe

Van de opschietende ranke
De andere scheuten op 2-3
bladeren zodanig dat het s

d) Het derde

Opgelet, nu snoeien we e
Van de twee lange opgaan
iets soepeler). De laagste
De afgebogen scheut snoe

e) Vervanging

Elk jaar opnieuw wordt de

f) Tips

Opgelet, nu snoeien we e
Van de twee lange opgaan
iets soepeler). De laagste
De afgebogen scheut snoe

g) Stekken

Stekken is het vermeerde
december tot februari wa
een één oogstek. Dat laa

We vertrekken van een po
zijn en vrij van ziekten.